

农作物病虫害情报

第八期

(2022年6月2日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 2303539

地址: 开平市长沙良园路60号

Email: kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

早稻破口期病虫害防治意见

据我中心于5月30日及6月1日到长沙、龙胜、苍城、赤水、金鸡、蚬冈等镇街调查发现, 我市部分稻田已开始破口扬花, 预计6月上旬全面进入破口期。当前我市早稻的主要病虫害是纹枯病、稻飞虱, 总体属偏轻、局部偏重发生。

一、纹枯病, 属偏轻、局部偏重发生。调查点病丛率如下: 长沙街道办民强村、龙胜镇官渡村、苍城镇楼田村<15%, 金鸡镇游东村20%, 赤水镇和安村70%, 蚬冈镇蚬南村80%。

二、稻飞虱, 属偏轻发生。调查点百丛虫量如下: 长沙街道办民强村、龙胜镇官渡村、苍城镇楼田村、金鸡镇游东村<200头, 赤水镇和安村300头, 蚬冈镇蚬南村1000头。

三、稻纵卷叶螟、钻蛀性螟虫、稻瘟病、胡麻叶斑病等病虫害零星发生。

四、防治意见

纹枯病应全面防控, 稻飞虱百丛虫量达1000头应施药防控, 其

他病虫害应根据为害程度进行挑治。稻瘟病发病田块及历史病区应及时施药，做好破口期及齐穗期防控工作。各稻田应做到“早破口早防治，迟破口迟施药”，避免在破口扬花期施药。

推荐药剂及亩用量如下：

1. 防治纹枯病，使用 19%啶氧·丙环唑 67 毫升、或 32.5%嘧菌酯·苯醚甲环唑 30 毫升、或 30%苯醚甲环唑·丙环唑 15 毫升、或 50%噻呋·己唑醇 10 克、或 20%井冈霉素 50 克。

2. 防治稻飞虱、蓟马，使用 10%三氟苯嘧啶 10 毫升、或 25%噻嗪酮 40 克、或 25%噻虫嗪 4 克、或 25%烯啶虫胺 20 克、或 25%吡蚜酮 20 克。

3. 防治稻纵卷叶螟，使用 6%乙基多杀菌素 30 毫升、或 15%茚虫威 12 毫升、或 20%氯虫苯甲酰胺 10 克、或 5%甲维盐 100 毫升、或 1.8%阿维菌素 100 毫升。

4. 防治钻蛀性螟虫，使用 10%四氯虫酰胺 20 克、或 10%虫螨腈 30ml、或 90%杀虫单 50 克。

5. 防治稻瘟病、胡麻叶斑病，使用 75%三环唑可湿性粉剂 30 克、或 40%稻瘟灵 80 毫升。

以上药剂兑水 70 公斤均匀喷施，药后 6 小时内遇中雨以上要及时补施。

如遇重大作物疫情，及时上报市农业综合服务中心。